



14 de octubre de 2021.-

Fórm. 235	<u>ETIQUETA APROBADA</u> <u>De Producto Fitosanitario*</u> Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-
------------------	--

A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:		
Nombre comercial: HALAXY		
Clase de uso (aptitud): HERBICIDA		
Tipo de la formulación: CONCENTRADO EMULSIONABLE		
Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
HALOXIFOP –P- METIL	11,2%	108 g/L
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: ariloxifenoxipropionato		
Número de Registro: 4003 Declaro que estará impreso en la etiqueta		
Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta		
Fecha de fabricación del producto: Declaro que estará impreso en la etiqueta		
Fecha de vencimiento Declaro que estará impreso en la etiqueta.-		
Nombre del fabricante o formulador: SHANDON WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.		
País de origen: CHINA		
Nombre y dirección de la firma registrante: SINO RAINBOW AGROSCEICNES S.A. Reconquista 517 piso 7, C.P 11.000, Montevideo- Uruguay. Tel: 2916 1225, fax: 2916 3053.		
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga “Cuidado-Veneno” (con símbolo de calavera)		

B RECOMENDACIONES DE USO:
<u>Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:</u>
Instrucciones de uso: nstrucciones de uso: HALAXY es un herbicida selectivo de cultivos de hoja ancha, post emergente que controla malezas de hoja angosta (gramíneas). Es absorbido por las hojas y se trasloca a los puntos de crecimiento, rizomas y raíces. Su mecanismo de acción es inhibiendo la síntesis de ácidos grasos a nivel de la membrana celular. Las malezas detienen su crecimiento y mueren.Instrucciones de uso:



Cultivo	Plaga (1)		Dosis L/ha
	Nombre Común	Nombre Científico	
Soja (<i>Glycine max</i>) Girasol (<i>Heliantus annuus</i>) Trebol blanco (<i>Trifolium repens</i>) Trebol rojo (<i>Trifolium pratense</i>) Alfalfa (<i>Medicago sativa</i>) Lotus (<i>Lotus spp.</i>)	Sorgo de alepo Pasto miel	<i>Sorghum halepense</i> <i>Paspalum dilatatum</i>	0,5- 0,9
hortalizas de hoja, Naranja (<i>Citrus sinensis</i>) Pomelo (<i>Citrus grandis</i>) Mandarina (<i>Citrus reticulata</i> Blanco) Mandarina Clementina (<i>Citrus reticulata</i> var. <i>Clementina</i>) Limon (<i>Citrus x limón</i>) Manzano (<i>Malus domestica</i>), Peral (<i>Pyrus comunis</i>), Duraznero (<i>Prunus persica</i>) Ciruelo (<i>Prunus domestica</i>) Arandanos (<i>Vaccinium carymbosum</i>) Vid (<i>Vitis vinifera</i>) Eucaliptus (<i>Eucalyptus globulus</i>) Eucaliptus (<i>Eucalyptus grandis</i>) Olivo (<i>Olea europaea</i>) Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)	Balango Raigras Capín Pasto blanco	<i>Avena fatua</i> <i>Lolium multiflorum</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Digitaria sanguinalis</i>	0,35-0,6
	Gramilla	<i>Cynodon dactylon</i>	1,2-1,5
PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.			
MOMENTO de aplicación: Aplicar sobre malezas en activo crecimiento con buena humedad del suelo antes de la floración de las mismas. Aplicar las dosis mínimas hasta el comienzo del macollaje. Las dosis máximas utilizarlas sobre malezas más desarrolladas.			
Número, frecuencia, o espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Una sola aplicación.			
Compatibilidad y fototoxicidad: No mezclar con herbicidas hormonales. En caso de mezclar con otros productos y no tener la certeza del comportamiento tanto físico como fisiológico de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.			
Tiempo de espera: Para pastoreo o corte de las forrajeras esperar 7 días. En cultivos 28 días deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha.			



No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

FRAJA COLOR AZUL



Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.- Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

A) MEDIDAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Aplicaciones foliares

- No producir deriva. Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales.
- En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua
- La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas.
- Situaciones climáticas que aumenten las posibilidades de ocurrencia. La Empresa aplicadora es la responsable por los daños que se produzcan.

B) PELIGROSIDAD

TOXICIDAD PARA AVES: Ligeramente tóxico

MEDIDAS DE MITIGACION:

Aplicaciones foliares

No aplicar desde madurez fisiológica en adelante

TOXICIDAD PARA PECES: Muy tóxico

MEDIDAS DE MITIGACION:

Aplicaciones foliares

No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorecen la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 h de aplicación) o deriva del producto

Prohibida la aplicación a una distancia a cuerpos de agua menor a 10 m en aplicaciones terrestres y 30 m en aplicaciones aéreas

Evitar la aplicación en surcos de erosión, desagües o áreas que descargan escorrentía en cuerpos de agua adyacentes.

No aplicar desde madurez fisiológica en adelante



TOXICIDAD PARA ABEJAS: Virtualmente no- tóxico

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

Disposición final de envases.

Una vez vaciado el contenido del envase realice el "Triple lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.

Una vez que el envase esté vacío perfórelo para evitar su reutilización como tal. Trasladar los envases limpios al centro de acopio más cercano.

D LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722".

"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

"USO AGRICOLA"

"Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta"

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".



NOTA

Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:

Tipo	Contenido neto	Material
Botella - frasco	0,1 – 0,2 L	PEAD / PET
Botella	0,5 – 1,0 L	PEAD / PET
Bidón	1, 5, 10, 20 Y 25 L	PEAD / PET
Tambor	100 Y 200 L	PEAD / PET

E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:
--

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

(1) **Técnico Asesor**, Ingeniero Agrónomo

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

(2) **Técnico Asesor**, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma