



**Dirección General de Servicios Agrícolas**  
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  
República Oriental del Uruguay  
Av. Millán 4703, Montevideo. CP 12.900  
Teléfono.: (0598-2) 309.84 10  
Web: <http://www.mgap.gub.uy>

## **TEXTO DE ETIQUETA CORREGIDO**

| <b>A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nombre comercial: <b>TRIBOT 50 F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                       |
| Clase de uso (aptitud): FUNGICIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| Tipo de la formulación: SUSPENSION CONCENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                       |
| Composición del producto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
| Nombre común del ingrediente activo: (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje en peso: | Contenido en volumen: |
| Iprodione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42.7 %              | 500 g/L               |
| Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: dicarboximida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                       |
| Número de Registro: estará impreso en la etiqueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| Número del lote o partida: estará impreso en la etiqueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                       |
| Fecha de fabricación del producto (mes y año): estará impreso en la etiqueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                       |
| Fecha de vencimiento (mes y año), o Tiempo de validez del producto (en años): estará impreso en la etiqueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                       |
| Nombre del fabricante o formulador: ALLCHEM S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                       |
| País de origen: URUGUAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |
| Nombre y dirección de la firma registrante: AGRO REGIONAL SRL. Dr. Pouey 496, Las Piedras, Uruguay. Tel: 2364 5400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                       |
| Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos similares. El local debe estar claramente señalizado. |                     |                       |

| <b>B RECOMENDACIONES DE USO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:</b> TRIBOT 50 SC es un fungicida de contacto con limitado efecto sistémico, de acción preventiva y curativa en todos los estadios de desarrollo del hongo. La acción más contundente es para el control de Botrytis y Sclerotinia. Es útil en los programas de manejo de resistencia aplicado en alternancia ó en mezcla con otros fungicidas de diferente modo de acción. El iprodione inhibe la germinación de las esporas. |

| Instrucciones de uso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cultivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enfermedad                                              |                                                            | Dosis               | Momento y frecuencia de aplicación                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nombre Común                                            | Nombre Científico                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cebolla<br>Lechuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podredumbre blanda de los vegetales<br>Podredumbre gris | <i>Sclerotinia sclerotiorum</i><br><i>Botrytis cinerea</i> | 100 -150 cc/100 lts | Ante la detección de la enfermedad, dirigir la aplicación al cuello.<br><br>A la aparición de los primeros síntomas en condiciones predisponentes.                                                                                                                                   |
| Tomate<br>Papa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tizón temprano                                          | <i>Alternaria solani</i>                                   | 100-150 cc/100lts   | Aplicar hasta dos veces por temporada, con intervalos de 10 a 15 días, en forma preventiva, cuando existan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de las enfermedades, especialmente a partir de floración.                                                           |
| Nectarina,<br>Damasco<br>Duraznero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Moho gris<br>Podredumbre morena                         | <i>Botrytis cinerea</i><br><i>Monilinia fructicola</i>     | 100-125 cc/100L     | Aplicar en floración, comenzando desde botón floral. Si las condiciones son favorables para el desarrollo de las enfermedades, aplicar nuevamente en plena flor.                                                                                                                     |
| Arándano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Moho gris                                               | <i>Botrytis cinerea</i>                                    | 100-150 cc/100lts   | Desde inicio de floración, repitiendo en forma periódica hasta que cesen las condiciones favorables.                                                                                                                                                                                 |
| Frutilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                            |                     | Aplicar en forma preventiva, cuando ocurran condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades. Comenzar las aplicaciones con 2 a 4 flores abiertas y repetir con 50 % de floración y especialmente cuando ocurran condiciones ambientales favorables para su desarrollo. |
| Vid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Moho gris                                               | <i>Botrytis cinerea</i>                                    | 100-150 cc/100lts   | Fin de floración, antes del cierre del racimo, envero y 15 a 20 días antes de cosecha. Alternar con productos de diferente modo de acción.                                                                                                                                           |
| <p>Compatibilidad y fitotoxicidad: TRIBOT 50 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Si existen dudas en la compatibilidad, realizar una prueba previa con cantidades pequeñas.</p> <p>No es fitotóxico para los cultivos indicados en esta etiqueta a las dosis recomendadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Tiempo de espera: Arándano: 10 días, Frutales: 14, , Vid 15 días, Tomate y frutilla: 3 días, Cebolla: 15 días, Lechuga: 5 días</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que haya se haya secado el depósito del producto aplicado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b><u>Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso</u></b></p> <p>RESISTENCIA. Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.</p> <p>Limitar el número de aplicaciones a 2 por temporada.</p> |                                                         |                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Modo de preparación y técnica de aplicación:</p> <p>Agitar bien el envase antes de su uso. Coloque agua en el estanque hasta la mitad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.-

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centro poblado y del límite del predio de centros educativos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN SU USO NORMAL IPCS/OMS, 2009.

**Primeros auxilios:**

En caso de contacto con los ojos: lavar con agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.

En caso de contacto con la piel: lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar.

En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

La franja de color referida a peligrosidad y pictogramas irán en la parte inferior de la etiqueta



Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento y evitar la deriva

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:<br>Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.<br>Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. |
| <u>Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:</u><br>Producto poco tóxico para aves y abejas; moderadamente tóxico para peces.<br>Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces.                                                     |
| <u>Disposición final de envases:</u> Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo. Luego perfora el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.                                                                                                                                                 |

|                                                                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>D</b>                                                                                                  | <b>LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA</b> |
| <b><u>"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".</u></b>                         |                                            |
| <b><u>"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: (2) 1722".</u></b>                                     |                                            |
| <b><u>"CONCURRE AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".</u></b>                          |                                            |
| <b><u>"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".</u></b>                                                |                                            |
| <b><u>"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".</u></b>                |                                            |
| <b>Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca</b>                            |                                            |
| <b><u>"USO AGRICOLA"</u></b>                                                                              |                                            |
| <b><u>"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA."</u></b>                 |                                            |
| <b><u>"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".</u></b> |                                            |
| <b><u>"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA."</u></b>                 |                                            |

## NOTA

### Dejo constancia que:

1. La información antes indicada será ordenada en una, dos, tres o cuatro columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:
- 3.

| Tipo                      | Contenido neto         | Material |
|---------------------------|------------------------|----------|
| Botella<br>18 cc<br>18 cc | 50, 100, 500 y 1000 cc | PEAD     |
| Bidón                     | 1 y 5 litros           | PEAD     |

## E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

|                                   |                     |       |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
| Apellidos y nombres completos (1) | Cédula de Identidad | Firma |
|                                   |                     |       |

(1) Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo

|                                   |                     |       |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
| Apellidos y nombres completos (2) | Cédula de Identidad | Firma |
|                                   |                     |       |

(2) Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)

|                                   |                     |       |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
| Apellidos y nombres completos (3) | Cédula de Identidad | Firma |
|                                   |                     |       |